

ASP VEGNI CONCORSO INFERMIERE PROVA PRATICA – PROVA 1

1) Gestione del catetere vescicale nella donna Indicare per ciascuna delle seguenti affermazioni l'esatto ordine di (V) vero (F) falso

- la posizione da far assumere alla donna è il decubito dorsale con le ginocchia flesse
- il kit per il cateterismo vescicale deve essere sterile e deve essere usata una tecnica sterile
- il catetere NON deve essere lubrificato mai

- 1) F, F, V
- 2) V, V, F
- 3) F, V, F

2) Misurazione della pressione sanguigna. Identificare la sequenza corretta:

- a) localizzare l'arteria brachiale. Posizionare il fonendoscopio in maniera adeguata sopra l'arteria brachiale
- b) spiegare al paziente che cosa si sta facendo e perché e come può collaborare
- c) leggere i valori sul manometro mentre si diminuisce la pressione. Gli ultimi battiti corrispondono alla pressione diastolica.

.....

3) Metti in ordine la sequenza per la pulizia della dentiera:

- a) preparare il materiale sul carrellino vicino al paziente
- b) identificare il paziente, informarlo e spiegargli la procedura
- c)porre i tovaglioli o l'asciugamano nel lavello mentre si spazzola la dentiera. Utilizzare lo spazzolino e il dentifricio , spazzolare tutte le superfici delicatamente e completamente . se il paziente lo desidera, aggiungere prodotti per la pulizia della dentiera e seguire le istruzioni

.....

4) LAVAGGIO DI UN PORT A – CATH

Identificare la sequenza corretta

- a) Inserire l'ago nel setto con un ago do 90°, spingendo verso la cute finché non tocca la base della camera del dispositivo di accesso
 - b) Aprire il telino sterile e far cadere sul campetto sterile tutto il necessario per l'inserimento dell'ago di Huber e per la medicazione
 - c) procedere al lavaggio del port a -cath
-

5) somministrazione di un clistere. Identifica la sequenza corretta:

- a) fare scorrere il liquido lentamente. Se il paziente ha dolore o sensazione di pienezza , usare il morsetto per chiudere il flusso per 30 secondi e riavviare il flusso più lentamente
 - b) lavarsi le mani ed osservare tutte le procedure per il controllo delle infezioni
 - c) far assumere al paziente adulto la posizione laterale sinistra con la gamba destra flessa il più possibile e posizionare una traversa assorbente sotto il bacino
- 1) B, C, A
 - 2) C, B, A
 - 3) A, B, C

6) Tampone faringeo. Identifica la sequenza corretta:

- a) inserire il tampone nel tubo sterile senza fargli toccare l'esterno del contenitore. Spingere la punta del tampone nel terreno di coltura liquido.
 - b) appoggiare dolcemente e rapidamente il tampone sulle tonsille soprattutto nelle zone particolarmente eritematose e/o su quelle che contengono essudato
 - c) invitare il paziente ad aprire la bocca e se necessario usare la torcia per illuminare il faringe e abbassare la lingua con la spatola.
- 1) A, B, C
 - 2) C, B, A
 - 3) B, C, A

7) Sondino Naso Gastrico in un paziente. Indicare per ciascuna delle seguenti affermazioni l'esatto ordine di (V) vero (F) falso

- la lunghezza del sondino da introdurre si misura mettendo la punta del sondino all'altezza della narice del paziente, estendendo il sondino al lobo dell'orecchio e poi alla punta del processo xifoide
- invitare il paziente a sorseggiare acqua con una cannuccia o a deglutire se non può assumere liquidi
- non lubrificare o bagnare la punta della sonda

- a) F, F, V
- b) V, F, V
- c) V, V, F

8) per una corretta esecuzione dell'esame per emocultura indicare per ciascuna delle seguenti affermazioni l'esatto ordine di (V)vero (F) falso

- più prelievi in concomitanza con l'acme febbrili
- due prelievi a distanza di 36 ore
- un prelievo a distanza di 12 ore dalla somministrazione dell'antibiotico

- a) V, F, F
- b) F, V, F
- c) F, V, V

9) Indica la sequenza corretta per la somministrazione di compresse o capsule.

- a) Prendere il giusto farmaco dall'armadio, dal carrello dei farmaci, dal frigorifero.
- b) tagliare solo le compresse segnate, se necessario e possibile, per ottenere il dosaggio giusto
- c) preparare la giusta quantità di farmaco facendo attenzione alle contaminazioni

- 1) A, C, B
- 2) A, B, C
- 3) B, A, C

10) Manovra di Heimlich in un adulto. indicare per ciascuna delle seguenti affermazioni l'esatto ordine di (V)vero (F) falso

- Posizionare il pollice piegato appena sopra l'ombelico e sotto il processo xifoideo del paziente
- Se l'individuo risponde NON eseguire compressioni
- Posizionarsi in piedi dietro al paziente e avvolgerlo con le braccia alle dita

1) F, F, V

2)F, V, F

3) V, F, V